



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE



AGENZIA REGIONALE SANITARIA
P.F. Assistenza Farmaceutica
Il Dirigente

Prot. n. 6688/ARS/ASFIP

Ancona, 29/06/2016

Al Direttore Generale
ASUR Marche

Al Direttore Generale
A.O.U. Ospedali Riuniti Ancona

Al Direttore Generale
A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord

Al Direttore Generale
I.N.R.C.A

Ai Direttori di Area Vasta

LORO SEDI

OGGETTO: Centri autorizzati alla diagnosi e prescrizione di farmaci sottoposti a limitazione

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute, riguardo il farmaco **HEMANGIOL propranololo**, si ritiene opportuno ricordare quanto indicato nella GU n. 79 del 5 aprile 2016.

La prescrizione può essere effettuata dalle seguenti figure mediche specialistiche:

- Pediatra/neonatologo
- Chirurgo pediatra
- Chirurgo vascolare
- Dermatologo
- Cardiologo pediatra
- Chirurgo plastico



La rimborsabilità a carico del S.S.N., in regime di dispensazione A(PT/PHT) RNRL, è limitata a pazienti seguiti presso centri pediatrici con diagnosi, da parte di unità operativa ospedaliera pediatrica in pazienti con età >5 settimane con le seguenti caratteristiche:

A) Indicazione

- Emangioma in fase proliferativa a rischio funzionale (vista, nutrizione, udito, abilità)
- Emangioma in fase proliferativa che costituisce minaccia per la vita (epatico, laringeo)
- Emangioma complicato da ulcerazione (dolore e rischio emorragico) che non risponde ai trattamenti topici
- Emangioma ed elevato rischio estetico

B) Posologia (avvio terapia e mantenimento):

- Prima settimana di terapia: 1 mg/kg/die suddiviso in 2-3 somministrazioni giornaliere
- Seconda settimane : 2 mg/kg/die suddiviso in 2-3 somministrazioni giornaliere
- Dalla terza settimana in poi: fino a 3 mg/kg/die suddiviso in 2-3 somministrazioni giornaliere

C) Durata terapia

- Almeno sei mesi
- Secondo ciclo di terapeutico nel caso di recidiva alla sospensione della terapia

D) Principali controindicazioni al trattamento:

- Prematuri di età effettiva inferiore a 5 settimane
- Evidenza clinico-anamnestica di broncospasma
- Blocchi atrioventricolari e malattia del nodo del seno
- Bradicardia ed ipotensione arteriosa secondo i limiti per età
- Cardiopatia con deficit miocardico di tipo contrattile

Ciò premesso, sono autorizzati alla prescrizione con onere a carico del SSN, i Medici specialisti delle U.O. di neonatologia e pediatria delle strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche.

Cordiali saluti.

Stefano Sagratella