

MONTALTO TARUGO

CARTA DI IDENTITA'




PROVINCIA: Pesaro e Urbino
COMUNI: Fossombrone
ZONA: Montana
QUOTA: da 200 a 476 m.
SUPERFICIE: 281,50 Ha

ISTITUZIONE: D.P.G.R. n. 155/01
BUR: n. 107 del 20.09.2001

CARTOGRAFIA: IGM F° 109 - II S.O. / 116 - I N.O.
CTR n. 280100

RIFERIMENTI WEB

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde#848_Finalità
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde#849_Schede
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde#850_Cartografia
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde#851_Specie
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde#856_Normativa



AMBIENTE

L'area comprende luoghi boschivi, arbusteti, coltivi, pascoli, luoghi erbosi e incolti che insistono sulla Formazione del Bisciario (Langhiano) e sulla Formazione dello Schlier (Tortoniano-Elveziano).

FLORA e VEGETAZIONE

La vegetazione arborea è costituita da lembi di querceto caducifoglio mesofilo e meso-xerofilo e di orno-ostrieto con Roverella (*Quercus pubescens*), Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), Orniello (*Fraxinus ornus*), Aceri (*Acer campestre*, *A. obtusatum*), ecc. Fra gli arbusti è molto frequente *Erica arborea* che in alcuni punti costituisce popolamenti pressochè puri e di grande estensione come comunemente non si incontrano nel resto della regione. Tali ericeti ospitano una interessante flora erbacea. In prossimità di S. Venanzio si trova poi un piccolo lembo di castagneto degradato. Nel bosco, nelle radure e negli arbusteti sono presenti numerose specie arbustive ed erbacee alcune delle quali estremamente rare.

INTERESSE BOTANICO

Fra gli arbusti particolarmente importante è la presenza del Citiso nero (*Lembotropis nigricans subsp. nigricans*) noto in pochissime località delle Marche, quasi tutte in provincia di Pesaro e Urbino. Fra le specie erbacee di particolare interesse vi sono due orchidee: la rarissima *Serapias cordigera* e *Dactylorhiza romana*, specie piuttosto sporadica, nota in pochissime località della regione e qui presente con varie e abbondanti popolazioni. Fra le specie presenti, si possono ricordare *Serapias vomeracea*, *Spiranthes spiralis*, *Lathyrus niger*, ecc.

UTILIZZO DEL TERRITORIO

Sono presenti colture agricole erbacee e i pascoli utilizzati per l'allevamento semibrado del bestiame. I boschi sono governati a ceduo.