

Allegato A

PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	ATC	CLASSE RIMB.	TIPO RICETTA	FORMA FARMACEUTICA	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	DITTA	NOTE	MONITORAGGIO AIFA	INDICAZIONI/MOTIVAZIONI	valutazione
ruxolitinib	JAKAVI	L01EJ01	H	RNRL	COMPRESSA	ORALE	NOVARTIS	già in ptof		malattia del trapianto contro l'ospite (GvHD): "Jakavi" e' indicato per il trattamento di pazienti di eta' pari o superiore ai 12 anni con malattia del trapianto contro l'ospite acuta o con malattia del trapianto contro l'ospite cronica che presentano una risposta inadeguata al trattamento con corticosteroidi o altre terapie sistemiche»	presad'atto
Empagliflozin	JARDIANCE	A10BK03	A	RR	COMPRESSE	ORALE	BOEHRINGER ING	Già IN PTOR per Insufficienza cardiaca		Trattamento della malattia renale cronica (MRC) nei pazienti adulti	presad'atto
mirikizumab	Omvo h	L04AC24	H	RRL	CONCENTRATO PER INFUSIONE	EV	ELI LILLY	scheda di prescrizione cartacea		indicato per il trattamento di pazienti adulti con colite ulcerosa attiva di grado da moderato a grave che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un trattamento biologico	Approvato
Bimekizumab	BIMZELX	L04AC21	H	RRL	SOLUZIONE INETTABILE	SOTTOCUTE	UCB PHARMA	Già in ptor nuova indicazione		Bimzelx, in monoterapia o in combinazione con metotressato, è indicato per il trattamento dell’artrite psoriasica attiva negli adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono risultati intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (disease-modifying antirheumatic drugs, DMARDs	presad'atto
ravulizumab	ULTOMIRIS	L04AA43	H	OSP	CONCENTRATO PER INFUSIONE	EV	ALEXION		si	Ultomiris® (ravulizumab) nel trattamento della miastenia gravis generalizzata (MGg) come terapia aggiuntiva alla terapia standard per il trattamento di pazienti adulti affetti da MGg e positivi agli anticorpi anti-recettore dell’acetilcolina (AChR) e per il disturbo dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD) positivi agli anticorpi anti-acquaporina 4 (AQP4).	presad'atto
cemiplimab	Libtayo	L01XC33	H	OSP	CONCENTRATO PER INFUSIONE	EV	SANO FI	Già in ptor		LIBTAYO in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulte con carcinoma della cervice uterina recidivante o metastatico con progressione di malattia durante o dopo un precedente trattamento con chemioterapia a base di platino	presad'atto
SELINEXOR	NEXPOVIO	L01XX66	H	RNRL	COMPRESSA RIVESTITA	ORALE	MENARINI		SI	Indicazione 1 Nexpovio è indicato in associazione a bortezomib e desametasone (Svd) per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una terapia precedente e refrattari alla lenalidomide Indicazione 2 Nexpovio è indicato in associazione a desametasone (Sd) per il trattamento del mieloma multiplo in pazienti adulti sottoposti ad almeno quattro terapie precedenti e la cui malattia è refrattaria ad almeno due inibitori del proteasoma, a due agenti immunomodulanti e a un anticorpo monoclonale anti-CD38 (penta-refrattari), che abbiano dimostrato progressione di malattia durante l’ultima terapia	sospensione dell'giudizio

pegunigalsidase alfa	ELFABRIO	A16AB20	H	RR	CONCENTRATO PER INFUSIONE	EV	CHIESI	malattia rara		Elfabrio è indicato come terapia di sostituzione enzimatica a lungo termine in pazienti adulti con diagnosi confermata di Malattia di Fabry (deficit di alfa-galattosidasi	presad'atto
avacopan	TAVNEOS	L04AJ05	H	RRL	CAPULA RIGIDA	ORALE	VIFOR FRESENIUS		SCEHDEDA DI MONITORAGGI O	Tavneos», in associazione ad un regime a base di rituximab o ciclofosfamide, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con granulatosi con poliangioite (GPA) o poliangioite microscopica (MPA) in fase attiva e severa	presad'atto
											Allegato A