

PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	ATC	CLASSE RIMB.	TIPO RICETTA	FORMA FARMACEUTICA	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	DITTA	NOTE	MONITORAGGIO AIFA	INDICAZIONI	VALUTAZIONE
GOZETOTIDE	LOCAMETZ	V09IX14	H	OSP	SOLUZIONE INIETTABILE	EV	NOVARTIS			<p>Medicinale solo per uso diagnostico.</p> <p>Locametz, a seguito della marcatura con gallio-68, è indicato per la rilevazione di lesioni positive all'antigene di membrana specifico della prostata (prostate-specific membrane antigen, PSMA) con tomografia a emissione di positroni (PET) in adulti con carcinoma prostatico (PCa) nei seguenti contesti clinici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stadiazione primaria di pazienti con PCa ad alto rischio prima della terapia curativa primaria, • Sospetta recidiva del PCa in pazienti con livelli crescenti di antigene prostatico specifico (prostate-specific antigen, PSA) nel siero dopo terapia curativa primaria, • Identificazione di pazienti con carcinoma prostatico metastatico progressivo resistente alla castrazione (metastatic castration-resistant prostate cancer, mCRPC) positivo al PSMA per i quali è indicata la terapia mirata al PSMA 	approvato
PIRTOBRUTINIB	JAYPIRCA	L01EL05	H	RNRL	COMPRESSE	orale	ELI LILLY		si	Jaypirca in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma a cellule mantellari (mantle cell lymphoma, MCL) recidivante o refrattario che sono stati precedentemente trattati con un inibitore della tirosin chinasi di Bruton (Bruton's tyrosine kinase, BTK).	presa d'atto
DUPILIMUMAB	DUPIXENT	D11AH05	A/PHT	RRL	penna/siringa	SC	SANOFI	PT cartaceo in G.U., indicazione prurigo nodulare con innovatività condizionata		<p>Estensioni d'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trattamento della dermatite atopica severa nei bambini di età compresa tra sei mesi e i cinque anni eleggibili per la terapia sistemica. - indicato nei bambini di età compresa tra sei e undici anni come trattamento di mantenimento aggiuntivo per asma severo con infiammazione di tipo 2 caratterizzato da aumento degli eosinofili ematici e/o aumento della frazione di ossido nitrico esalato (FeNO) non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria (ICS) a dose da media ad alta più un altro medicinale per il trattamento di mantenimento. <p>Nuove indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trattamento dell'esofagite eosinofila in adulti e adolescenti di età pari o superiore a dodici anni, con un peso di almeno 40 kg, non adeguatamente controllati da, intolleranti a, o che non sono candidati per la terapia farmacologica convenzionale. - Trattamento di adulti con prurigo nodulare (PN) da moderata a severa eleggibili per la terapia sistemica. 	presa d'atto
FENFLURAMINA	FINTEPLA	N03AX26	A/PHT	RNRL	SOLUZIONE ORALE	orale	UCB PHARMA	già in PTOR, nuova indicazione, malattia rara		Fintepla è indicato per il trattamento di crisi epilettiche associate alla sindrome di Dravet e alla sindrome di Lennox-Gastaut come terapia aggiuntiva ad altri medicinali antiepilettici in pazienti di età pari o superiore ai 2 anni.	presa d'atto
Linzagolix sale di colina	YSELTY	H01CC04	A	RNRL	COMPRESSE	orale	THERAMEX ITALY	nota 51		Yselty è indicato per il trattamento dei sintomi da moderati a severi dei fibromi dell'utero nelle donne adulte in età riproduttiva.	approvato